



Produkt	Borverbindung	Borgehalt
Epso Bor Top*	Borsäure	40 g/kg
Wuxal Boron*	Borsäure	108 g/l
Agro Hi Bor	Borethanolamin	150 g/l
Borsäure*	Borsäure	150 g/kg
Lebosol-Bor	Borethanolamin	150 g/l

* beeinflusst nicht den pH-Wert

Alle Produkte sind mit handelsüblichen Flüssigdüngern kombinierbar.
Allgemein empfiehlt es sich, bei einem mittleren Borbedarf 700g und bei erhöhtem Bedarf 1400g Reinbor über das Zuckerrüben-Blatt zu düngen. Zusätzlich zur Bordüngung decken 80 g Mangan den Bedarf der Zuckerrübe ab.
Eine Applikation in den Abendstunden wird empfohlen.

AGRANA Zucker GmbH
A-3430 Tulln, Josef-Reither-Strasse 21-23
E-Mail: rohstoffzucker@agrana.com



www.agrana.com



BORDÜNGUNG



VORSICHT BEI TROCKENPERIODEN

WORAUF IST ZU ACHTEN:

- › Eine regelmäßige Beobachtung ist unbedingt nötig.
- › Ein Mangel aufgrund schlechter Verfügbarkeit kann auch bei hohen Gehalten im Boden auftreten.
- › Aus diesem Grund sollen im Trockengebiet Borspritzungen auch bei ausreichenden Gehalten im Boden eingeplant werden.

DIE EUF-BODENUNTERSUCHUNG VON AGRANA BIETET HILFESTELLUNG:

Bei Empfehlungen von 1 kg B/ha ist eine Ausbringung um den Blattschluss mit 700 g Reinbor als Blattapplikation zielführend.

Bei Empfehlungen von 2 kg B/ha ist ein Splitting mit je 700 g Reinbor zu Blattschluss sowie bis Mitte Juli angebracht.

BOR MANGELSYMPTOME

Blätter werden rau und brüchig



Quelle: BISZ

Querrisse am Blattstiel,
Zerstörung der Leitungsbahnen



Quelle: BISZ

BOR MANGELSYMPTOME

Die jüngsten Blätter sind braun bis schwarz



Quelle: BISZ

Gewebepartien verfärben sich und vertrocknen
(Herz- und Trockenfäule)



Quelle: BISZ