FUNGIZIDTABELLE

Reg.Nr.	Fungizid	Wirkstoffe	Wirkstoff-gehalt	max. Aufwand-menge in kg, l * ha	max. Zahl an Anwendungen
Wirkungsweise: Multi Site; FRAC Code: M					
3034	Cuprofor flow	Kupferoxychlorid	380 g Cu/l	2,6	4
2746	Dithane NeoTec [1]	Mancozeb	760 g/kg	2	4
3297	Penncozeb DG [1]	Mancozeb	750 g/kg	2	4
Schwefel: Wirkung gegen echten Mehltau Multi Site; FRAC Code: M					
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	800 g/kg	7,5	4
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	800 g/kg	7,5	4
2632	Thiovit Jet	Schwefel	800 g/kg	7	4
3701	Microthiol WG	Schwefel	800 g/kg	7,5	4
3997	Thiopron	Schwefel	825 g/l	7,5	2
Wirkungsweise DMI (Triazole); FRAC Code: 3					
2481	Caddy 200 EC	Cyproconazol	200 g/l	0,4	2
2685	Spyrale	Difenoconazol Fenporpidin	100 g/l 375 g/l	1	2
3255	Score Mavita 250 SC	Difenoconazol	250 g/l	0,4	2
3361	Domark 10 EC Alcedo Eminent	Tetraconazol	100 g/l	1	2
3629	Rubric	Epoxiconazol	125 g/l	1	2
3741	Armure [2]	Difenoconazol Propiconazol	150 g/l 150 g/l	0,6	2
3896	Brisk [2]	Difenoconazol Propiconazol	250 g/l 250 g/l	0,5	1
Wirkungsweise: DMI (Triazole) + MBC (Benzimidazole & Thiophanate); FRAC Code: 3+1					
3596	Duett ultra	Epoxiconazol Thiophanatmethyl	187 g/l 310 g/l	0,6	2
Wirkungsweise: DMI (Triazole) + QoI (Strobilurine); FRAC Code: 3+11					
2978	Sphere SC [3]	Cyproconazol Trifloxystrobin	160 g/l 375 g/l	0,35	1
Wirkungsweise: QoI (Strobilurine) *ACHTUNG: Keine Wirkung von Strobilurin gegen Cercospora!*					
2711	Ortiva	Azoxystrobin	250 g/l	1	2

1) Gefahr im Verzug - Zulassung gem. Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
2) Letztmalige Anwendung in der Saison 2019
3) Anwendung nur als Pack empfohlen, wegen Resistenz keine Wirkung des Strobilurinanteils gegen Cercospora

AGRANA RISIKOBEWERTUNG

Stark erhöhter Risikostandort, wenn 2 der 5 Punkte zutreffen:

- Beregnung
- Anfällige Sorte (ab Einstufung 6)
- Verseuchtes Rübenfeld aus dem Vorjahr innerhalb 300 m Umkreis
- Vorjahresschlag unmittelbar neben dem derzeitigen Rübenfeld
- Standort in bekanntem Frühbefallsgebiet (z.B. in Staulagen, Flussnähe ...)

Es gibt keine heilende Wirkung der Rübenfungizide!

MASSNAHMEN CERCOSPORA BETICOLA

Entscheidend für den Erfolg ist die exakte Einhaltung der Behandlungstermine, d.h. die erste Behandlung ist bei Auftreten der ersten Symptome durchzuführen — BETAEXPERT-Blattmonitoring + sofortige Behandlung nach SMS Warnmeldung!

www.betaexpert.at

AGRANA

KONTAKT

AGRANA Zucker GmbH
Rohstoffabteilung
Josef-Reither-Strasse 21-23
3430 Tulln, AUSTRIA
e-mail: rohstofftz@agrana.com

Stand: Juni 2019

WWW.AGRANA.COM

AGRANA FUNGIZID-EMPFEHLUNGEN

AGRANA ZUCKER

1. BEHANDLUNG: TRIAZOL + MULTI-SITE

Triazol	+	Multi-Site (Kontaktfungizid)
0,6 l/ha Armure		1,25 l Cuprofor flow
oder		oder
1 l/ha Domark 10 EC		2 kg Dithane NeoTec
oder		oder
1 l/ha Rubric		2 kg Penncozeb DG
oder		
0,4 l/ha Score		
oder		
0,75 l/ha Sphere maxx		
oder		
1 l/ha Spyrale		

HINWEIS:
Armure und Brisk aufbrauchen!
Letztmalige Anwendung 2019!

2. BEHANDLUNG: DUETT ULTRA + MULTI-SITE

Triazol + Thiophanate	+	Multi-Site (Kontaktfungizid)
0,6 l/ha Duett ultra		1,25 l Cuprofor flow
		oder
		2 kg Dithane neotec
		oder
		2 kg Penncozeb DG

NUR EINE ANWENDUNG MIT DUETT ULTRA!

WIRKSTOFFE:

Die Anwendung von Multi-Site Wirkstoffen (Kupfer, Mancozeb) ist sowohl für die Wirkung als auch für das Resistenzmanagement unbedingt notwendig!

ADDITIVE UND BLATTDÜNGER:

Tankmischungen mit Bor möglich!
> Bei Anwendung von Triazolen auf PH-Wert achten!
> Ansäuern der Spritzbrühe durch Zugabe von Zitronensäure empfohlen!

Bei Mehltau und anhaltender Trockenheit wird zu allen Mischungen die Zugabe von 3 kg bzw. 3l Schwefel empfohlen.

FOLGEBEHANDLUNG (WIE 1. BEHANDLUNG): TRIAZOL + MULTI-SITE

Tankmischungen wie bei 1. Behandlung.

Resistenzmanagement:
Triazole anwenden, die nicht in den ersten beiden Spritzungen enthalten waren!

SPÄT– UND ABSCHLUSSBEHANDLUNGEN:

Ab 20. August: Multi-Site (Kontaktfungizid)

Multi-Site (Kontaktfungizid)
1,25 l Cuprofor flow
oder
2 kg Dithane NeoTec
oder
2 kg Penncozeb DG