

## AUSGEWÄHLTE RÜBENHERBIZIDE

Produkt	Reg.Nr.	HRAC-Gr.	Wirkstoffe	Wirkstoff- gehalt: (g/l, kg)
Tramat 500	2945	N	ethofumesat	500
Ethofol	3421			
Metafol Super	3645	C1 N	metamitron + ethofumesat	350 150
Goltix Gold	3069	C1	metamitron	700
Beetix 700 SC Metafol SC Nymeo SC	3573			
Glotron 700 SC	4276			
Goltix Titan	3370	C1 O	metamitron + quinmerac	525 40
Kezuro	3886	C1 O	metamitron + quinmerac	571 71
Betosip SC Betasana SC	3183	C1	phenmedipham	160
Belvedere Duo	2707	C1 N	phenmedipham + ethofumesat	200 200
Betanal Tandem <sup>2)</sup>	3677	C1 N	phenmedipham + ethofumesat	200 190
Venzar 500 SC <sup>1)</sup>	3682	C1	lenacil	500
Debut, Safari	2521	B	triflusulfuron	486
Shiro 500	3970			
Lontrel 720 SG	3409	O	clopyralid	720
Lontrel 600	3612	O	clopyralid	600
Cliophar 600 SL	3611			
Spectrum	2798	K3	dimethenamid-P	720
Tanaris <sup>3)</sup>	3697	K3 O	dimethenamid-P + quinmerac	333 167

<sup>1)</sup> Nicht mehr als die zugelassenen Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, Lenacil enthaltenden Mitteln, Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre. <sup>2)</sup> Nicht mehr als die zugelassenen Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 J. auf derselben Fläche erfolgen darf. Die maximale Wirkstoffaufwandmenge darf auch bei zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Ethofumesat enthalten, 1 kg/ha nicht überschreiten. <sup>3)</sup> Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die die Wirkstoffe Dimethenamid-p oder Quinmerac enthalten.



# HERBIZID STRATEGIE

2023

AGRANA Zucker GmbH  
A-3430 Tulln, Josef-Reither-Strasse 21-23  
E-Mail: rohstoffzucker@agrana.com



www.agrana.com



# GRÄSERBEKÄMPFUNG

Empfehlung bei bereits aufgelaufenen Ungräsern

Zwischen den NAK-Behandlungen eine Solobekämpfung mit einem Gräsermittel je nach Entwicklungsstadium der Ungräser durchführen: bis zu 1 l/ha Focus Ultra + 0,6 l/ha Spectrum (kein Öl).

Diese Empfehlung unterstützt die Bodenwirkung gegen keimende Ungräser und Unkräuter wie Amarant, Hundspetersilie, Schwarzer Nachtschatten und Franzosenkraut.

## 1. NAK

Im Keimblattstadium

1-1,25 l Belvedere Duo	oder	1 l Beetix
1-1,25 l Betanal Tandem	oder	1-2 l Goltix Gold
1,25-1,5 l Betosip/ Betasana + 0,4-0,5 l Ethofol oder Tramat	oder	1 l Metafol SC
	oder	1 l Nymeo SC
	oder	1,5-2 l Goltix Titan
	oder	0,9 l Kezuro + 0,5-1 l Goltix Gold

oder

1,25-1,5 l Betosip/ Betasana	oder	2 l Metafol Super
---------------------------------	------	-------------------

Additiv: 1 l Öl oder Gondor, Hasten, Mero nach Herstellerangabe!  
Additivmenge an Witterung und zusätzliche Mischpartner anpassen!

## 2. NAK 8-10 Tage nach 1. NAK

## 3. NAK 8-10 Tage nach 2. NAK

1,3 l Belvedere Duo	oder	1,5-2 l Beetix
1,25-1,5 l Betanal Tandem	oder	1,5-2 l Goltix Gold
1,5-2 l Betosip/ Betasana + 0,4-0,5 l Ethofol oder Tramat	oder	1,5-2 l Metafol SC
	oder	1,5-2 l Nymeo SC
	oder	2 l Goltix Titan
	oder	1,3 l Kezuro + 0,5-1 l Goltix Gold

oder

1,5-2 l Betosip/ Betasana	oder	2 l Metafol Super
------------------------------	------	-------------------

Additiv: 1 l Öl oder Gondor, Hasten, Mero nach Herstellerangabe!  
Additivmenge an Witterung und zusätzliche Mischpartner anpassen!

+ (nur falls notwendig)

0,3 l (2. NAK) 0,6 l (3. NAK) Spectrum oder 0,6 l Tanaris oder  
20-30 g Debut + 0,2 l Netzmittel + ev. 100-150 ml Venzar

Additiv auf 0,5 l Öl reduzieren  
Gondor oder Hasten ersetzen Netzmittel

Gräsermittel	Aufwandmenge bei	
	Hirsearten/ Flughäfer	Quecke
Select 240 EC		
Clethofin 240	0,75 l	1 l
Arrodim		
Centurion Plus	1 l	2,5 l
Bemye		
VextaDim 240 EC	0,75 l	-
Focus Ultra	2 l	5 l
Fusilade Max	1 l	2 l
Agil-S Zetrola		
Ready <sup>*)</sup>	1 l	1 l
Targa Super		
Maceta 100	0,6 l	1,25 l
Gramfix		
Panarex	1,5 l	2,25 l
Grasser 100 EC	0,6 l	1 l
Leopard	1,25 l	2,5 l

Bei Targa und Select sind 2 l Öl notwendig, ansonsten verbessern bei trockenen Bedingungen 1-3 l Öl die Wirksamkeit.

<sup>\*)</sup> Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Jahr und Kultur, keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diesen Wirkstoff enthaltenden Mitteln.

Bei Bedarf ist die Zumischung eines Insektizides möglich.

Alle im Folder angeführten Herbizid-Empfehlungen gelten je Hektar.