

Tipps gegen Problemunkräuter

Amarant Erhöhung der Aufwandmengen bei Metamitronprodukten und/oder Spectrum einsetzen.

Weißer Gänsefuß nicht zu spät bekämpfen, sollte im Keimblatt behandelt werden.

Schönmalve unbedingt Debut als Mischungspartner verwenden.

Stechapfel erhöhte Aufwandmengen aller Produkte.

Ausfallraps Erhöhte Metamitronmenge zur 1. NAK, Debut in 2. und 3. NAK einsetzen.

Ausfallsonnenblume Debut oder Lontrel einsetzen, Achtung bei Clearfield-Sonnenblume ist Debut nicht wirksam!

Distel bei wüchsigem Wetter vor dem Aufstengeln mit 1,2 l Lontrel 100 oder 160 g Lontrel 720 und Zugabe von 2 l Öl/ha behandeln.

Gräserbekämpfung

Empfehlung bei bereits aufgelaufener Ungräser:

Zwischen den NAK-Behandlungen eine Solobekämpfung mit einem Gräsermittel je nach Entwicklungsstadium der Ungräser durchführen.

bis zu 1,0 l/ha Focus Ultra + 0,6 l/ha Spectrum (kein Öl)

Diese Empfehlung unterstützt die Bodenwirkung gegen keimende Ungräser und Unkräuter wie Amarant, Hundspetersilie, Schwarzer Nachtschatten und Franzosenkraut.

Ist zum Spritzzeitpunkt jedoch noch keine Hirse aufgelaufen, kann zur 2. NAK 0,3 l und zur 3. NAK 0,6 l Spectrum (kein Öl) als Bodenversiegelung appliziert werden.

| Gräsermittel | Aufwandmenge bei | |
|---------------|--------------------------|-------------|
| | Hirsearten/ Flughafer | Quecke |
| Agil-S | 0,75 - 1,0 l | |
| Targa Super | 0,5 - 0,75 l | 1,0 - 1,5 l |
| Fusilade Max | 0,8 - 1,0 l | 2,0 l |
| Select 240 EC | 0,5 - 0,75 l | |
| Focus Ultra | 1,5 - 2,0 l | 3,0 l |
| Gallant Super | 0,5 l | 1,0 l |
| Panarex | 1,5 l | 2,25 l |

Bei Targa und Select sind 2 l Öl notwendig, ansonsten verbessern bei trockenen Bedingungen 1-3 l Öl die Wirksamkeit

Herbizidstrategien



3:3

3 Spritzungen in 3 Wochen!

Feuchtgebiet

1. NAK* - im Keimblattstadium (Empfehlungen/ha)

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---|------|-----------------------|---|--|
| oder | 1,0 Betanal maxxPro | | oder | 2,0 Goltix Titan | | Je nach Witterungsbedingungen |
| oder | 0,8 - 1,0 Betanal Expert | | oder | 1,0 Goltix gold | | 0,3-0,5 11E Öl |
| oder | 1,0 Belvedere extra | + | oder | 1,0 kg Goltix compact | + | |
| oder | 1,25 Pantopur | | oder | 1,0 Beetix SC** | | |
| oder | 1,25 Betasana Trio | | oder | 1,0 Modipur** | | Achtung: bei Pantopur, Betasana Trio, Kontakt 320, |
| oder | 1,0 Powertwin plus | | | | | Powertwin - 0,5 - 1,0 11E Öl |

2. NAK*- 10 Tage nach 1. NAK (Empfehlungen/ha)

| | | | | | | |
|------|------------------------------|---|------|-----------------------|---|---|
| oder | 1,25 - 1,5 Betanal maxxPro | | oder | 2,0 Goltix Titan | | 0,3 - 0,5 Trammat 500 |
| oder | 1,25 Betanal Expert | | oder | 1,0 Goltix gold | | oder 0,3 - 0,5 Ethosat 500 |
| oder | 1,0 - 1,25 Belvedere extra | + | oder | 1,0 kg Goltix compact | + | oder 0,3 - 0,5 Galipur |
| oder | 1,5 Pantopur | | oder | 1,0 Beetix SC** | | oder 20 (-30)g Debut + 0,2 Netzmittel (kein Öl) |
| oder | 1,5 Betasana Trio | | oder | 1,0 Modipur** | | +/oder 0,3 Spectrum (kein Öl) |
| oder | 1,0 - 1,2 Powertwin plus | | | | | |

3. NAK*- 10 Tage nach 2. NAK (Empfehlungen/ha)

| | | | | | | |
|------|------------------------------|---|------|-----------------------|---|--|
| oder | 1,25 - 1,5 Betanal maxxPro | | oder | 2,0 Goltix Titan | | Je nach Witterungsbedingungen |
| oder | 1,25 Betanal Expert | | oder | 2,0 Goltix gold | | 0,3 - 0,5 11E Öl |
| oder | 1,0 - 1,25 Belvedere extra | + | oder | 1,5 kg Goltix compact | + | Achtung: bei Pantopur, Betasana Trio, Kontakt 320, |
| oder | 1,5 Pantopur | | oder | 2,0 Beetix SC** | | Powertwin - 0,5 - 1,0 11E Öl |
| oder | 1,5 Betasana Trio | | oder | 2,0 Modipur** | | |
| oder | 1,0 - 1,2 Powertwin plus | | | | | (+) wenn notwendig |

*NAK = Nachauflaufbekämpfung im Keimblattstadium des Unkrautes
 ** max. zwei Anwendungen im Nachauflauf



+/oder 20 - 30 g Debut + 0,2 | Netzmittel (kein Öl)
 +/oder 0,6 | Spectrum (kein Öl)