



Rinpode® technikai ismertető


2026

Rinpode®

Rinskor™ aktív

GYOMIRTÓ SZER

Engedélyezés folyamatban!



Rinpod[®] termékismertető

Rinpod[®]

Rinskor™ aktív

GYOMIRTÓ SZER

Rinpod [®]	Florpyrauxifen-benzyl (Rinskor™)
Gyomirtószer típusa	Posztemergens gyomirtószer cukorrépában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen
Formuláció	25.05g/l EC
Kémiai besorolás	Arilpikolinátok – Szintetikus auxinok (HRAC group 4/O)
Engedélyezett kultúra	Cukorrépa és takarmányrépa
Kijuttatható dózis	Maximum 0,08 l/ha, maximum 4 kezelésben megosztva • 4 kezeléssel programban: 0.02 l/ha • 3 kezeléssel programban: 0.026 l/ha • 2 kezeléssel programban: 0,04 l/ha
Kijuttatási ablak	Posztemergensen a kultúrnövény kelésétől a sorok záródásáig (BBCH10-19)
Főbb erősségek	• Új hatásmechanizmusú, szelektív gyomirtó szer cukorrépában • Jó hatékonyság a kulcsfontosságú, a jelenlegi kínálattal sokszor nehezen irtható cukorrépa-gyomok ellen: <i>Chenopodium album</i>, <i>C. hybridum</i>, <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Mercurialis annua</i> • Nincs utónövény korlátozás. • Jól kiegészíti és növeli a hatékonyságot a hagyományos gyomirtási programokban alkalmazva • Nincsenek fizikai, kémiai vagy biológiai kompatibilitási problémák más növényvédő szerekkel. • Jó eszköz a fotoszintézis-gátló vagy ALS-inhibitor herbicidekkel szemben rezisztens gyomok megelőzésére és irtására cukorrépában.





Florpyrauxifen-benzyl szintetikus auxin (auxin-utánzó) csoportba tartozik. Számos növényi életfolyamatot gátol, mint pl. fehérjeszintézis és sejtnövekedés gátlás.

Kémiai szerkezete alapján az új alcsoport, az *Arilpikolinátok* tagja


Florpyrauxifen-benzyl

- Hatásmód: auxin-utánzó
- HRAC-csoport: 4
- Arilpikolinátok alcsoport
- Szisztémikus
- Levélen keresztül hat
- Szelektív a kultúrnövényre



Arylpicolinates


Rinpod[®] önálló hatékonysága a kezelésszám függvényében




Engedélyezés folyamatban!

Rinpod® spektruma a kezelésszám függvényében


1 application (0.08 L/ha) x 1




2 applications (0.04 L/ha) x 2




3 applications (0.026L/ha) x 3



4 applications (0.02L/ha) x 4




Metamitron + etofumezat, Rinpod[®]-al és anélkül (3-alkalommal kijuttatva)



Rinpod[®] használatával a hagyományos gyomirtási programokban magasabb hatékonyság érhető el **selyemmályva, szőrös disznóparéj, fehér libatop** ellen

Metamitron + etofumezat + *fenmedifam*, Rinpod[®]-al és anélkül (3-alkalommal kijuttatva)



Rinpod használatával a hagyományos gyomirtási programokban magasabb hatékonyság érhető el **selyemmályva, szőrös disznóparéj, fehér libatop** ellen

Rinpod[®] hatékonysága ConvisoSmart cukorrépában

A Rinpod[®] növeli a ConvisoSmart technológia hatékonyságát

Rinpod[®] használatával a Conviso technológiákban magasabb hatékonyság érhető el, elsősorban **parlagfű, selyemmályva, libatop fajok** és **egynyári szélfű** ellen.

Segít megelőzni a herbicid rezisztencia kialakulását a gyomnövényekben.

BETA Kutató Intézet véleménye a Rinpod[®] alkalmazásáról

"A Rinpod[®] hozzáadása a metamitron, fenmedifán és etofumezát alapú hagyományos cukorrépa gyomirtó kombinációkhoz 3 vagy 4 alkalommal, mindig kiegészíti és/vagy javítja a gyomirtó kombinációk hatékonyságát olyan gyomokkal szemben, mint a *Chenopodium album*, *Ammi majus*, *Aethusa cynapium*, *Mercurialis annua*, *Galium aparine*."

"A Rinpod[®] alkalmazása a cukorrépa alapvető gyomirtási módszereinél segíthet megelőzni a gyomnövények herbicidekkel szembeni rezisztenciájának kialakulását, ami egyre gyakoribb hazánkban is. Ezenkívül segíthet a más hatásmechanizmusú (ALS gátló, fotoszintézis gátló a PSII rendszerben) herbicidekkel szemben már rezisztens gyomok elleni védekezésben is."